

Utfodringstabell för regnbågslax

Vår

- Södra och Mellersta Finland, från våren till slutet av juni. Norr om Uleåborg, från våren till medlet av juli.
- Södra och Mellersta Sverige från våren till slutet av juni. Norra Sverige från våren till medlet av juli.
- Talen anger utfodringsmängden i procent av biomassan per dygn (= mängden foder i kilogram för 100 kilogram fisk per dygn).

FISKENS STORLEK g

		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500
Tempe- ratur °C	2	0,1	0,1	0,1	0,63	0,6	0,58	0,55	0,47	0,42	0,37	0,36	0,35	0,33	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
	4	0,1	0,1	1,3	0,95	0,89	0,84	0,82	0,79	0,74	0,63	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,5	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,38	0,36	0,33	0,32	0,3	0,29
	6	0,1	2,4	2,1	1,26	1,26	1,26	1,05	1,05	0,95	0,84	0,82	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71	0,7	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,6	0,57	0,54	0,53	0,51	0,5
	8	3,64	3,2	3,17	3,31	2,98	2,43	2,32	1,87	1,71	1,6	1,54	1,49	1,39	1,35	1,33	1,31	1,28	1,23	1,21	1,19	1,17	1,13	1,09	1,07	1,05	1,03	1	0,96	0,93	0,84	0,79	0,72	0,65	0,61
	10	4,55	4	3,8	3,81	3,49	2,87	2,54	2,09	1,98	1,96	1,93	1,93	1,9	1,87	1,87	1,85	1,82	1,76	1,71	1,68	1,62	1,5	1,46	1,39	1,35	1,33	1,29	1,24	1,16	1,04	0,9	0,77	0,72	0,66
	12	5,46	4,72	4,14	4	3,58	3,05	2,72	2,51	2,38	2,31	2,29	2,28	2,28	2,27	2,27	2,23	2,15	2,1	2,05	2	1,89	1,81	1,77	1,73	1,68	1,66	1,64	1,61	1,58	1,5	1,46	1,31	1,05	0,95
	14	6,37	5,52	4,77	4,3	4,1	3,7	3,4	3,19	3,14	3,09	3,04	2,99	2,96	2,91	2,87	2,84	2,81	2,73	2,63	2,63	2,58	2,47	2,42	2,27	2,16	2,06	1,96	1,85	1,75	1,65	1,5	1,38	1,13	0,98
	16	7,21	6,32	5,49	4,52	4,17	3,73	3,5	3,3	3,2	3,15	3,1	3,05	2,99	2,94	2,91	2,89	2,85	2,78	2,73	2,63	2,52	2,47	2,35	2,26	2,1	2	1,94	1,89	1,79	1,63	1,47	1,26	0,94	0,82
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2,49	2,3	2,05	1,75	1,7	1,68	1,65	1,63	1,61	1,59	1,57	1,56	1,52	1,5	1,48	1,44	1,41	1,38	1,29	1,25	1,17	1,1	1,05	1	0,97	0,95	0,9	0,81	0,73	0,57	0,45
	20 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	1,71	1,62	1,57	1,52	1,47	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,21	1,19	1,16	1,14	1,13	1,12	1,09	1,07	0,99	0,95	0,94	0,88	0,86	0,82	0,8	0,75	0,67	0,59	0,52	0,4	0,3
Upp- skattad foder- koefficient	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Då syreförhållandena är bra och temperaturen jämn, kan man på eget bevåg överskrida tabellens rekommendationer.

2) Foderkoefficient för beräkning av biomassan.

Då utfodring sker enligt tabellen bör syrehalten på det utgående vattnet vara minst 7 mg/l.

Utfodringstabell för regnbågslax

Sommar

- Södra och Mellersta Finland, från början av juli till slutet av augusti. Norr om Uleåborg, ungefär från medlet av juli till medlet av augusti.
- Södra och Mellersta Sverige från början av juli till slutet av augusti. Norra Sverige ungefär från medlet av juli till medlet av augusti.
- Talen anger utfodringsmängden i procent av biomassan per dygn (= mängden foder i kilogram för 100 kilogram fisk per dygn).

FISKENS STORLEK g

		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500
Temperatur °C	8	3,64	3,2	3,17	3,15	2,84	2,31	2,21	1,79	1,63	1,45	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,15	1,12	1,1	1,07	1,05	1,02	1	0,99	0,97	0,95	0,93	0,9	0,87	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
	10	4,55	4	3,8	3,53	3,22	2,73	2,42	2	1,89	1,9	1,8	1,76	1,73	1,7	1,67	1,63	1,58	1,52	1,47	1,42	1,35	1,29	1,22	1,2	1,17	1,15	1,12	1,07	1,02	0,95	0,89	0,83	0,77	0,7
	12	5,46	4,72	4,14	3,81	3,41	2,82	2,52	2,32	2,21	2,1	2,05	2,02	2,01	2	1,95	1,9	1,83	1,76	1,72	1,7	1,65	1,57	1,52	1,5	1,45	1,43	1,4	1,38	1,36	1,3	1,25	1,18	1,1	1
	14	6,37	5,52	4,77	4,03	3,73	3,33	2,82	2,72	2,69	2,54	2,52	2,43	2,41	2,39	2,35	2,3	2,27	2,21	2,18	2,12	2,05	2	1,9	1,8	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,42	1,33	1,23	1,1	0,95
	16	7,21	6,32	5,49	3,84	3,55	3,17	2,69	2,62	2,56	2,56	2,52	2,48	2,46	2,41	2,38	2,34	2,29	2,23	2,16	2,1	2,02	1,93	1,86	1,75	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,43	1,31	1,2	0,95	0,8
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2,3	2,12	1,9	1,61	1,55	1,53	1,52	1,5	1,45	1,43	1,4	1,42	1,39	1,35	1,31	1,28	1,24	1,2	1,18	1,11	1,06	1	0,98	0,95	0,92	0,89	0,85	0,79	0,74	0,58	0,53
	20 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	1,5	1,45	1,4	1,35	1,32	1,27	1,2	1,15	1,12	1,08	1,04	1	0,95	0,91	0,9	0,88	0,86	0,83	0,8	0,77	0,76	0,72	0,7	0,68	0,66	0,64	0,6	0,55	0,5	0,45	0,35
Uppskattad foderkoefficient	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Då syreförhållandena är bra och temperaturen jämn, kan man på eget bevåg överskrida tabellens rekommendationer.

2) Foderkoefficient för beräkning av biomassan.

Då utfodring sker enligt tabellen bör syrehalten på det utgående vattnet vara minst 7 mg/l.

Utfodringstabell för regnbågslax

Höst

- Södra och Mellersta Finland, från början av september till slutet av hösten. Norr om Uleåborg, från medlet av augusti till slutet av hösten.
- Södra och Mellersta Sverige från början av september till slutet av hösten. Norra Sverige från medlet av augusti till slutet av hösten.
- Talen anger utfodringsmängden i procent av biomassan per dygn (= mängden foder i kilogram för 100 kilogram fisk per dygn).

		FISKENS STORLEK g																																		
		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500	
Tempe- ratur °C	2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	4	0,1	0,1	1,3	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	6	0,1	2,4	2,1	1,51	1,39	1,21	1,09	0,91	0,79	0,72	0,7	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,6	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	0,42	0,4	0,37	0,35	
	8	3,64	3,2	3,17	2,4	2,16	1,76	1,68	1,36	1,24	1,16	1,1	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,9	0,88	0,86	0,84	0,82	0,79	0,78	0,76	0,74	0,72	0,7	0,66	0,62	0,57	0,52	0,47	0,44	
	10	4,55	4	3,8	2,9	2,6	2,08	1,84	1,6	1,5	1,45	1,42	1,4	1,38	1,36	1,33	1,31	1,28	1,25	1,22	1,18	1,14	1,06	1,01	0,99	0,96	0,93	0,91	0,86	0,8	0,72	0,65	0,57	0,5	0,48	
	12	5,46	4,72	4,14	3,04	2,88	2,3	2	1,9	1,8	1,7	1,65	1,61	1,59	1,58	1,57	1,55	1,51	1,45	1,43	1,4	1,38	1,3	1,27	1,23	1,2	1,17	1,15	1,12	1,09	1	0,92	0,85	0,73	0,67	
	14	6,37	5,52	4,77	3,52	3,2	2,54	2,15	2,07	2,1	2,05	2,02	2	1,98	1,95	1,94	1,92	1,87	1,82	1,78	1,76	1,7	1,65	1,6	1,5	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,1	1	0,9	0,78	0,68	
	16	7,21	6,32	5,49	3,52	3,2	2,54	2,3	2,15	2,12	2,1	2,05	2	1,97	1,96	1,94	1,91	1,88	1,82	1,78	1,75	1,7	1,61	1,57	1,52	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,1	1	0,9	0,7	0,56	
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,25	1,2	1,15	1,14	1,12	1,1	1,08	1,06	1,04	1,01	0,99	0,97	0,95	0,91	0,88	0,85	0,8	0,78	0,76	0,74	0,69	0,63	0,58	0,53	0,4	0,32	
Upp- skattad foder- koefficient	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Då syreförhållandena är bra och temperaturen jämn, kan man på eget bevåg överskrida tabellens rekommendationer.
2) Foderkoefficient för beräkning av biomassan.
Då utfodring sker enligt tabellen bör syrehalten på det utgående vattnet vara minst 7 mg/l.